

Oswalin®

Kolloidales Siliziumdioxid 15 % plus Magnesium C 315

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Qualitätsprodukt Oswalin® entschieden haben. Unsere Nahrungsergänzungsmittel werden unter höchsten Qualitätsstandards hergestellt.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Nahrungsergänzungsmittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an uns oder Ihren Apotheker.

1. Packungsinhalt

In dieser Verpackung sind enthalten:

- Eine Flasche Oswalin® Siliziumdioxid 15%, 100 ml
- 20 Beutel Magnesium C 315, à 4 g
- Produktinformation

2. Was ist Oswalin®?

Oswalin® ist eine sinnvolle Ergänzung aber kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise. 1 ml Oswalin® entspricht 150 mg kolloidalgelöstem Siliziumdioxid.

Hochdosiertes Magnesiumcitrat kombiniert mit Vitamin C, Magnesium C 315, unterstützt die Aufnahme von kolloidalgelöstem Siliziumdioxid und trägt zur Aufrechterhaltung normaler gesunder Knochen, Zähne und Muskelfunktion bei. Magnesium hat eine Funktion bei der Zellteilung.

3. Zutaten Oswalin® Siliziumdioxid 15% und Magnesium C 315

Zutaten Oswalin® Siliziumdioxid 15 %:

Wasser (84,7 %), Siliziumdioxid (15 %), Säureregulator Natriumhydroxid (0,3 %)

Zutaten Mineraldrink Magnesium C 315 + Vitamin C:

Magnesiumcitrat (50,7 g/100 g), Orangenfruchtpulver (Maltodextrin, Citronensäure, Orangensaftkonzentrat) 20,5 %, Säuerungsmittel (Citronensäure, Säureregulator), Vitamin C (2 g/100 g), Farbstoff (β-Carotin), Aroma (Orange, Zitrone), Süßstoffe (Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium)

Stand: März 2020

4. Verzehrempfehlung Oswalin®

1x täglich, vor dem Frühstück, nüchtern 1 ml Oswalin® pro 25 kg Körpergewicht verdünnt in einem Glas Wasser (150 ml) einnehmen. Empfehlenswert ist die Einnahme mindestens 30 Minuten vor dem Frühstück.

Alle 2 Tage den Inhalt eines Beutels Magnesium C 315, mittags oder abends, in einem Glas Wasser (150 ml) gut verrühren und trinken. **Oswalin® und Magnesium C 315 nicht zusammen einnehmen.**

Es wird empfohlen vor der Einnahme von Magnesium C 315 mindestens 3 Stunden zur letzten Einnahme von Oswalin® abzuwarten.

Die angegebenen, empfohlenen Verzehrsmengen dürfen nicht überschritten werden.

5. Wie ist Oswalin® aufzubewahren?

Aufbewahrung: Raumtemperatur, 5 – 35°C, nicht im Kühlschrank aufbewahren.

Nach Anbruch innerhalb von 30 Tagen aufbrauchen.

Vor Sonnenlicht schützen.

Bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6. Weitere Informationen

Herstellerinformation:

Alnapharm AG & Co. KG
Poppenbütteler Bogen 68
22399 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 600 88 31-0
Fax: +49 (0)40 600 88 31-50

osvalin@alnapharm.com

www.alnapharm.com

Made in Germany